Tabela. Zabiegi przeciwko chorobom przed kwitnieniem

Nazwa choroby, szkodnika lub chwastu	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana ilość wody]
Antraknoza *(Glomerella acutata)* **Szara pleśń** *(Botryotynia fuckeliana, Botrytis cinerea)* **Zamieranie pędów** *(Phomopsis spp.)*	**Matador 303 SE (mo)** **Moderator 303 SE (mo)** **Yamato 303 SE (mo)** **[10]**	1,2-1,5 l/ha [500-900 l/ha
	Switch 62,5 WG (mo) **[7]**	0,8–1,0 kg/ha [500–2000 l/ha]
Mączniak prawdziwy *(Microsphaera penicillata var. vaccini)*	**Discus 500 WG (mo)** **[21]**	0,2 kg/ha [200–1000 l/ha]
	Luna Sensation 500 SC (mo) **[7]**	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
	Siarkol 800 SC (mo) **Siarkol 80 WG (mo)** **Siarkol 80 WP (mo)** **Siarkol Bis 80 WG (mo)** **Siarkol Extra 80 WP (mo)** **[7]**	3,0–5,0 kg/ha [1000 l/ha]
Rdza wejmutkowo-porzeczkowa *(Cronartium ribicola)*	**Luna Sensation 500 SC (mo)** **[7]**	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
Szara pleśń *(Botrytis cinerea)*	**Teldor 500 SC (mo)** **[3]**	1,5 l/ha [max. 2000 l/ha]