

Tabela. Ochrona truskawek przeciwko szkodnikom w okresie kwitnienia oraz rozwoju owoców

Nazwa choroby, szkodnika lub chwastu	Nazwa środka [Karencja-dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana dawka wody]
Kwiecek malinowiec (<i>Anthonomus rubi</i>)	Decis Ogród 015 EW [3]	0,6–0,8 l/ha [700 l/ha]
	Deka 2,5 EC (mo) Desha 2,5 EC (mo) Poleci 2,5 EC (mo) [7]	0,5 l/ha [500-700 l/ha]
	Verimark 200 SC [1]	0,375 l/ha [stosować podczas nawadniania]
Mączlik szklarniowy (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Mączlik ostroskrzydły (<i>Bemisia tabaci</i>)	Naturalis (mo) [nie stosować w dniu zbioru]	0,75-1 l/ha [600-1000 l/ha]
	Sivanto Prime (mo) [3]	0,625 l/ha [600-1000 l/ha]
Mszyce (<i>Aphidoidea</i>)	Decis Mega 50 EW (mo) Delta 50 EW (mo) [3]	0,25 l/ha [300-600 l/ha]
	Patriot 100 EC (mo) [7]	0,075 l/ha [300-600 l/ha]
	Deka 2,5 EC (mo) Desha 2,5 EC (mo) Poleci 2,5 EC (mo) [7]	0,5 l/ha [500-700 l/ha]
	Sivanto Prime (mo) [3]	0,5 l/ha [600-1000 l/ha]
Muszka płamoskrzydła (<i>Drosophila suzuki</i>) Zwójka: różoweczka, truskaweczka, poziomeczka, jabłoneczka, jesienna, złocienióweczka (<i>Tortricidae</i>)	Decis Mega 50 EW (mo) Delta 50 EW (mo) [3]	0,25 l/ha [300-600 l/ha]
	Patriot 100 EC (mo) [7]	0,075 l/ha [300-600 l/ha]
	Deka 2,5 EC (mo) Desha 2,5 EC (mo) Poleci 2,5 EC (mo) [7]	0,5 l/ha [500-700 l/ha]
	SpinTor 240 SC (mo) [3]	0,32-0,4 l/ha [200-1200 l/ha]
Przędziorek chmielowiec (<i>Tetranychus urticae</i>)	Abamax 018 EC (mo) Acaramik 018 EC (mo) Grot 18 EC (mo) Pestar 018 EC (mo) Pirtius 018 EC (mo) Safran 18 EC [3]	1,2 l/ha [500-1200 l/ha]

	Floramite 240 SC (mo) Bifenmite 240 SC (mo) [1]	0,4-0,6 l/ha [1000 l/ha] Truskawka pod osłonami: 0,04–0,06%
	Naturalis (mo) [nie stosować w dniu zbioru]	0,75-1 l/ha [600-1000 l/ha]
	Nissorun Strong 250 SC (mo) [3]	0,4 l/ha [500-1500 l/ha]
	Ortus 05 SC (mo) [7]	2,0 l/ha [500-100 l/ha]
	Afik [nie dotyczy]	0,3 %
	Emulpar 940 EC [nie dotyczy]	0,9-1,2 %
	Siltac EC [nie dotyczy]	0,15-0,2 %
Roztocz truskawkowiec <i>(Phytonemus pallidus)</i>	Amarant 05 SC Ortus 05 SC [7]	1,0-1,25 l/ha [500-1000 l/ha]
Wciornastek różówek <i>(Thrips fuscipennis)</i>	Naturalis (mo) [nie stosować w dniu zbioru]	truskawka pod osłonami: 1-1,5 l/ha [600-1000 l/ha]