

Tabela. Program ochrony agrestu przeciwko szkodnikom oraz chorobom po kwitnieniu

Nazwa choroby, szkodnika lub chwastu	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana dawka wody]
<b>Amerykański mączniak agrestu</b> ( <i>Sphaerotheca mors-uae</i> )	<b>Armicarb SP (mo)</b> <b>Karbicure SP (mo)</b> [nie dotyczy]	5,0 kg/ha [600-1500 l/ha]
	<b>Discus 500 WG (mo)</b> [21]	0,2 kg/ha (0,02%: 20 g na 100 l wody) [500-700 l/ha]
	<b>Luna Sensation 500 SC</b> [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
	<b>Nimrod 250 EC</b> [14]	0,75-1,5 l/ha [500 l/ha]
	<b>Pallas 100 EC (mo)</b> <b>Topas 100 EC (mo)</b> [20]	0,5 l/ha [200-1000 l/ha]
	<b>Serenade ASO (mo)</b> [nie dotyczy]	8,0 l/ha [500-750 l/ha]
	<b>Siarkol 80 WP (mo)</b> <b>Siarkol Extra 80 WP (mo)</b> [7]	3,0-5,0 kg/ha [1000 l/ha]
	<b>Siarkol 800 SC (mo)</b> <b>Siarkol 80 WG (mo)</b> <b>Siarkol Bis 80 WG (mo)</b> [7]	3,0-5,0 kg/ha [1000 l/ha]
<b>Zato 50 WG (mo)</b> [14]	0,2 kg/ha [750 l/ha]	
<b>Antraknoza (opadzina) liści porzeczki</b> ( <i>Drepanopeziza ribis</i> )	<b>Biszop 80 WG (mo)</b> <b>El Cappo 80 WG (mo)</b> <b>Kapelan 80 WG (mo)</b> <b>Kaplan 80 WG (mo)</b> <b>Pastor 80 WG (mo)</b> [7]	1,8 kg/ha [500-1000 l/ha]
	<b>Dithane NeoTec 75 WG (mo)</b> <b>Mancozeb 75 WG (mo)</b> [30]	2,0 kg/ha [400-1000 l/ha]
	<b>Luna Sensation 500 SC</b> [7]	0,6-0,8 l/ha [500-750 l/ha]
	<b>Serenade ASO (mo)</b> [nie dotyczy]	8,0 l/ha [500-750 l/ha]
	<b>Zato 50 WG (mo)</b> [14]	0,2 kg/ha
<b>Czarna plamistość agrestu</b> ( <i>Alternaria alternata</i> )	<b>Dithane NeoTec 75 WG (mo)</b> <b>Mancozeb 75 WG (mo)</b> [30]	2,0 kg/ha [400-1000 l/ha]
<b>Szara pleśń</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Teldor 500 SC (mo)</b> [3]	1,5 l/ha [max. 2000 l/ha]
<b>Mszyce: agrestowa, agrestowo-mleczowa, porzeczkowo-poziewnikowa</b> ( <i>Aphididae</i> )	<b>Calypso 480 SC (mo)</b> [21]	0,2 l/ha [500-750 l/ha]
<b>Muszka plamoskrzydła</b> ( <i>Drosophila suzukii</i> )	<b>SpinTor 240 SC (mo)</b>	0,32-0,4 l/ha [200-1200 l/ha]

Nazwa choroby, szkodnika lub chwastu	Nazwa środka [Karencja - dni]	Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana dawka wody]
<b>Zwójki (<i>Tortricidae</i>): bukóweczka, siatkóweczka, różóweczka i inne oraz gąsienice innych gatunków owadów liściożernych</b>	[3]	
<b>Przędziorek chmielowiec (<i>Tetranychus urticae</i>)</b>	<b>Afik</b> [nie dotyczy]	0,2–0,3% [200–750 l/ha]
	<b>Emulpar 940 EC</b> [nie dotyczy]	0,9–1,2% [200–750 l/ha]
	<b>Siltac EC</b> [nie dotyczy]	0,15–0,2% [200–750 l/ha]
	<b>Ortus 05 SC (mo)</b> [14]	1,5 l/ha [500–100 l/ha]